Baltosios garstyčios
Sinapis alba L.

SINEX

Ilgesnė vegetacija - daugiau biomasės (H2)

Vėlyva, ilgai išlieka vegetacijos stadijose
Sukaupia didelį žalios masės kiekį
Mažas polinkis išgulimui suteikia pasėliui stabilumą
Po šalnų augalai natūraliai sunyksta, nereikalauja sudėtingo įterpimo
Gerina dirvos struktūrą ir maisto medžiagų prieinamumą
Mažina ligų ir kenkėjų užkrato kiekį dirvožemyje
Funkcionalus tarpinis augalas runkelių, kukurūzų ir javų sėjomainoms

AGRONOMINĖS SAVYBĖS	Mažas			Vidutinis			Didelis		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biomasės formavimas	●	●	●	●	●	o	o	o	o
Vegetacijos trukmė	●	●	●	●	●	●	●	●	o
Augalų aukštis (žydėjimo tarpsniu)	●	●	●	●	●	o	o	o	o
Augalų aukštis (pilnos brandos tarpsniu)	●	●	●	●	●	●	●	o	o
Sėklų skaičius ankštaroje	●	●	●	●	●	o	o	o	o
Polinkis žydėti	●	●	o	o	o	o	o	o	o
Polinkis išgulti	●	●	o	o	o	o	o	o	o
Tinkamumas tarpinių augalų mišiniams	●	●	●	●	●	●	●	●	o

KOKYBINIAI RODIKLIAI	Mažas			Vidutinis			Didelis		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Atsparumas runkelinėms nematodoms	H2 (gali sumažinti runkelinių nematodų kiekį 70-90 %)								
1000 sėklų svoris	●	●	●	●	●	o	o	o	o
1000 sėklų svoris, g	5,60-6,61								

Vertinimo skalė balais: 1-labai ankstyva, labai žema, labai, jautri; 5- vidutinė; 9-labai vėlyva, labai aukšta, labai atspari

Skirtingais metais įvertinimai gali skirtis nuo nurodytų

Rekomenduojama sėjos norma sėklų auginimui: 10-12 kg/ha
Rekomenduojama sėjos norma žaliai trąšai: 20-25 kg/ha