agrolitpa
Augantiems kartu...

# Didžiosios smilgos
*Agrostis gigantea* Roth.
# VIOLETA



**Skirta vėlyvųjų žolynų sudarymui, juose pakeičianti pievines migles**

- Augalai daugiamečiai, stačiastiebiai
- Formuoja tankią velėną, vidutinį stiebą ir ilgus žiedynus
- Dėl vėlyvo vystymosi augalai pjaunami jauni (prieš žydėjimą)
- Pašarine verte nusileidžia geriausioms miglinėms žolėms
- Tinka šienauti, gera pašaro kokybė
- Tinka į mišinius su raudonaisiais dobilais, esparcetais bei kitais ankštiniais augalais ir motiejukais
- Gali augti įvairios sudėties ir drėgnio dirvožemiuose
- Tinka karjerų, užkastų dujotiekių ir kitų apleistų žemių rekultivavimui

Rekomenduojama sėjos norma: 5 kg/ha

| | | |
|---|---|---|
| Ploidiškumas | ● ● ● ● ● ● | 6 |

## DERLINGUMAS ir KOKYBĖ

| | |
|---|---|
| Sausų medžiagų (SM) derlius, t/ha | 7,8 |
| SM derliaus potencialas, t/ha | 9,8 |
| Lapuotumas, % | 40,0–52,0 |
| Baltymų kiekis, % | 8,9–11,6 |
| Ląstelienos kiekis, % | 17,3–27,6 |
| Sėklų derlingumas, kg/ha | 210 |
| Sėklų derlingumo potencialas, kg/ha | 460 |

## AGRONOMINĖS SAVYBĖS

| | | |
|---|---|---|
| Lapų plotis sėjos metais rudenį | ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ | 5 |
| Žiedynų formavimas sėjos metais | | nėra/labai silpnas |
| Pavasarinio augimo pradžios laikas | ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 3 |
| Augalų aukštis pavasarį | ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ | 5 |
| Augalų aukštis žydėjimo metu, cm | | 40-100 |
| Išplaukėjimo laikas | ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 3 |
| Augalų augimo būdas plaukėjant | | pusiau gulsčias |
| Stiebo su žiedynu ilgis | ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ | 5 |
| Žiedyno ilgis | ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ | 7 |
| Žiedyno ilgis, cm | | iki 15 |
| Viršutinio tarpubamblio ilgis | ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ | 4 |
| Tendencija formuoti žiedynus atole | | nėra/labai silpna |
| Žiemkentiškumas | ● ● ● ● ● ● ● ● ○ | 8 |
| 1000 sėklų svoris, g | | 0,14-0,20 |

Vertinimo skalė balais: 1 - labai ankstyva, labai žema; labai jautri; 5 - vidutinė; 9 - labai vėlyva, labai aukšta; labai atspari
Skirtingais metais įvertinimai gali skirtis nuo nurodytų