agrolitpa
Augantiems kartu...

Eraičinsvidrės
*x Festulolium* Asch. & Graebn - *x Festulolium*

# PUNIA DS (4n)



**Puikus žiemojimas, prisitaikymas prie įvairių augimo sąlygų**

- Gausiažiedės svidrės ir tikrojo eraičino hibridas
- Ankstyvos, ganyklinio šienaujamo tipo
- Greitas suželia ir įsišaknija, gausus pirmasis derlius
- Augalai smarkiai krūmijasi, keras stačios formos
- Stiebai minkšti ir lapuoti
- Pašaro kokybė gera, puikiai tinka siloso gamybai
- Puikiai tinka mišiniuose su kitų rūšių žolėmis

Rekomenduojama sėjos norma: 15-18 kg/ha

| | | |
|---|---|---|
| Ploidiškumas | ● ● ● ● | 4 |

## DERLINGUMAS ir KOKYBĖ

| | |
|---|---|
| Sausų medžiagų (SM) derlius, t/ha | 7,3-13,1 |
| Atolo SM derlius, % nuo bendro derliaus | 40,3 |
| Baltymų kiekis, % | 8,6-13,4 |
| Virškinamumas, % | 69,1 |
| Ląstelienos kiekis, % | 26,1 |
| Tirpių angliavandenių kiekis | didelis |
| Lapuotumas, % | 51-66,3 |

## AGRONOMINĖS SAVYBĖS

| | | |
|---|---|---|
| Pavasarinis atžėlimas | | ankstyvas |
| Atžėlimas po pjūčių | ● ● ● ● ● ● ● ● ○ | 8 |
| Augalų aukštis, cm | | 80-100 |
| Augalų aukštis pilnai išsivysčius | ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ | 5 |
| Lapo plotis | ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ | 5 |
| Augalų aukštis plaukėjant | ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ | 5 |
| Išplaukėjimo laikas | ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 3 |
| Stiebo su žiedynu ilgis | ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ | 5 |
| Viršutinio tarpubamblio ilgis | ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 3 |
| Tendencija formuoti žiedynus atole | ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ | 7 |
| Ilgalaikiškumas, metai | | 5 |
| Žiemkentiškumas | | 4,9-7,3 |
| 1000 sėklų svoris, g | | 3,44-4,09 |

## ATSPARUMAS LIGOMS

| | |
|---|---|
| Lapų dėmėtligės | atsparios |
| Rūdys | atsparios |

Vertinimo skalė balais: 1 - labai ankstyva, labai žema; labai jautri; 5 - vidutinė; 9 - labai vėlyva, labai aukšta; labai atspari
Skirtingais metais įvertinimai gali skirtis nuo nurodytų