Nendriniai eraičinai

*Festuca arundinacea Schreb.*

# KAROLINA

**Veislė vėsesniam klimatui**



- Puikūs sausos masės derliai
- Derlius būna apie 20 % didesnis nei tikrųjų eraičinų
- Atsparūs sausrai, ilgaamžiai
- Geras žiemkentiškumas, toleruoja atšiaurias žiemas
- Geras virškinamumas (panašus kaip ir tikrųjų eraičinų)
- Sėjama mišiniuose siloso gamybai

Rekomenduojama sėjos norma: 9-12 kg/ha

| | | |
|---|---|---|
| Ploidiškumas | ● ● ● ● ● ● | 6 |

## DERLINGUMAS IR KOKYBĖ

| | |
|---|---|
| Sausų medžiagų (SM) derlius, t/ha | 12,25 |
| I-os pjūties SM derlius, t/ha | 4,088 |
| II-os pjūties SM derlius, t/ha | 5,26 |
| III-os pjūties SM derlius, t/ha | 3,46 |
| Virškinamumas, % | 66,9-69,9 |
| Baltymų kiekis, % | 13,9 |
| Sėklų derlingumas, kg/ha | 600-800 |
| Sėklų derliaus potencialas, kg/ha | >1000 |

## AGRONOMINĖS SAVYBĖS

| | | |
|---|---|---|
| Žiedynų formavimas sėjos metais | ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 2 |
| Išplaukėjimo laikas | ● ● ● ● ● ● ● ● ○ | 8 |
| Augalų aukštis plaukėjant | ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ | 5 |
| Lapų smulkumas | ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ | 6 |
| Stiebo su žiedynu ilgis | ● ● ● ● ● ● ● ● ○ | 8 |
| Žiedyno ilgis | ● ● ● ● ● ● ● ● ● | 9 |
| Žiemkentiškumas | | geras |
| Atsparumas išgulimui | | vidutinis |
| Atsparumas sausrai | | atsparūs |
| 1000 sėklų svoris, g | | 2,45 |

## ATSPARUMAS LIGOMS

| | |
|---|---|
| Atsparumas ligų kompleksui | geras |

Vertinimo skalė balais: 1 - labai ankstyva, labai žema; labai jautri; 5 - vidutinė; 9 - labai vėlyva, labai aukšta; labai atspari
Skirtingais metais įvertinimai gali skirtis nuo nurodytų