Pašariniai (aliejiniai) ridikai **Patikima įvairiomis sąlygomis (H2)**

Raphanus sativus L. var. *oleiformis* Pers.

LUCAS

Intensyvaus augimo ir didelės biomasės tetraploidas
Spartus pradinis vystymasis
Vegetacijos trukmė apie 90–100 d.
Masyvus ir gilus šaknynas efektyviai purena kietus dirvos sluoksnius
Šaknų sistema didina dirvos biologinį aktyvumą ir kapiliarų kiekį
Toleruoja sausras, lengvus, mažiau derlingus dirvožemius

AGRONOMINĖS SAVYBĖS	Mažas			Vidutinis			Didelis		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biomasės formavimas	●	●	●	●	●	●	●	●	o
Vegetacijos trukmė	●	●	●	●	●	●	●	o	o
Augalų aukštis (žydėjimo tarpsniu)	●	●	●	●	●	●	o	o	o
Augalų aukštis (pilnos brandos tarpsniu)	●	●	●	●	●	●	●	●	o
Sėklų skaičius ankštaroje	●	●	●	●	●	o	o	o	o
Polinkis žydėti	●	●	●	●	●	o	o	o	o
Polinkis išgulti	●	●	●	●	●	o	o	o	o
Polinkis žydėti sėjant vėlai vasarą	●	●	o	o	o	o	o	o	o
Tinkamumas tarpinių augalų mišiniams	●	●	●	●	●	●	●	●	●

KOKYBINIAI RODIKLIAI	Mažas			Vidutinis			Didelis		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Atsparumas runkelinėms nematodoms	H2 (gali sumažinti runkelinių nematodų kiekį 70-90 %)								
1000 sėklų svoris	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1000 sėklų svoris, g	12,24-16,97								

Vertinimo skalė balais: 1-labai ankstyva, labai žema, labai, jautri; 5- vidutinė; 9-labai vėlyva, labai aukšta, labai atspari

Skirtingais metais įvertinimai gali skirtis nuo nurodytų

Rekomenduojama sėjos norma sėklų auginimui: 10-14 kg/ha
Rekomenduojama sėjos norma žaliai trąšai: 25-30 kg/ha