agrolilpa
Augantiems kartu...

Pašarinių (aliejinių) ridikų auginimo sėklai technologija

Dirvožemis	Dirvai nereiklūs, gerai auga priemolio, priesmėlio ir netgi smėlio dirvose. Geriausiai dera sukultūrintuose priesmėlio ir priemolio dirvožemiuose, kurie pavasarį neužmirksta, o jų pH ne mažesnis kaip 5,5.
Sėjomaina	Geras priešsėlis yra kaupiamieji augalai, javai, daugiametės žolės. Dažniausiai ridikai sėklai auginami po javų, nes geresni priešsėliai skiriami kitiems reiklesniems augalams.
Tręšimas	Sudygus augalams, pasėlis patręšiamas azotu N 60. Jei dirva labai neturtinga maisto medžiagų, prieš dirvos paruošimą naudinga patręšti fosforo ir kalio trąšomis P 60 K 60, tada augalai užmezga daugiau ankštarų ir suformuoja jose daugiau sėklų.
Sėjos laikas	Balandžio pabaigoje ar gegužės pirmoje pusėje (kai sėjamas vasarojus).
Sėklos norma	10-14 kg/ha. Sėjama 2-4 cm gylyje, 12-15 cm tarpueiliais. Sėklos pradeda dygti esant 1-3 °C temperatūrai. Dygstantys augalai ištveria –4-5 °C šalnas, nenukenčia, kai –3 °C šalčio temperatūra laikosi net kelias dienas. Vėliau, augalams augant, atsparumas šalčiui mažėja.
Pasėlio priežiūra	Kartais augalų butonizacijos pradžios tarpsniu augalus pažeidžia spragės, rapsiniai pjūkleliai, kopūstinės kandys. Augalų butonizacijos tarpsniu pastebėjus bent 2 rapsinius žiedgraužius ant vieno augalo, pasėlį būtina nupurkšti insekticidais.
Nuėmimas	Sėklų derlius nuimamas tiesiogiai kombainu ir tik išimtiniais atvejais taikomas atskirtinis nuėmimo būdas. Tada nupjauti į pradalges ridikai paliekami kelioms dienoms, sėklos geriau subręsta, lengviau kuliasi. Iš visų kryžmažiedžių augalų sunkiausia kulti pašarinius ridikus, jų ankštaros, net ir visiškai sudžiūvusios, neatsidaro, todėl kulti reikia esant labai sausam orui visiškai išdžiūvusias ankštaras.
Kita	Žydėjimo metu augalus noriai lanko bitės ir kiti vabzdžiai. Jų apdulkinti žiedai greičiau užmezga ankštaras, augalai vienodžiau bręsta.