Valgomieji šakniniai ridikai
Raphanus sativus var. *longipinnatus* L.

MINO EARLY

Šaknis dirba, kai kiti augalai ilsisi

Ankstyva veislė, vasaros ir rudens sėjai
Formuoja ilgus, stambius, pleišto ar kūgio formos šakniavaisius
Gilios šaknys purena dirvą, mažina suslėgimą ardo susidariusi „padą“
Gerina dirvožemio aeraciją bei vandens įsiskverbimą
Maksimalus efektyvumas pasiekiamas drėgnesniuose dirvožemiuose
Sėjai po pagrindinių augalų rūšių
Greitai suformuoja didelę biomasę

AGRONOMINĖS SAVYBĖS	**Mažas**			**Vidutinis**			**Didelis**		
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Biomasės formavimas	●	●	●	●	●	●	●	●	o
Vegetacijos trukmė	●	●	●	o	o	o	o	o	o
Augalų aukštis (žydėjimo tarpsniu)	●	●	●	●	●	o	o	o	o
Augalų aukštis (pilnos brandos trapsniu)	●	●	●	●	●	●	o	o	o
Augimo greitis po sudygimo	●	●	●	●	●	●	●	●	o
Piktžolių stelbimas	●	●	●	●	●	●	o	o	o
Tinkamumas tarpinių augalų mišiniams	●	●	●	●	●	●	●	●	●

KOKYBINIAI RODIKLIAI	**Mažas**			**Vidutinis**			**Didelis**		
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Šaknies įsiskverbimo gylis	●	●	●	●	●	●	●	●	o
Dirvos struktūros gerinimas	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Maisto medžiagų sulaikymas/fiksavimas	●	●	●	●	●	●	●	●	o
Biomasės mineralizacija	●	●	●	●	●	●	o	o	o

Vertinimo skalė balais: 1-labai ankstyva, labai žema, labai, jautri; 5- vidutinė; 9-labai vėlyva, labai aukšta, labai atspari

Skirtingais metais įvertinimai gali skirtis nuo nurodytų

Rekomenduojama sėjos norma žaliai trąšai: 6-8 kg/ha